

Wann kann meine Hündin aufnehmen und wann ist das beste Deckverhalten bei einer Anpaarung im Natursprung zu erwarten?

Fertile Periode	3 Tage vor Ov bis 4 Tage nach Ov
Bestes Deckverhalten an einem der 3 Tage:	Ov, Ov+1, Ov+2 (Für Natursprung empfehlenswerte Tage)
Deckverhalten wird schlechter werden:	Ov+3 oder Ov+4

Wann sollen Progesteronbestimmungen im Rahmen der Deckzeitbestimmung wiederholt werden?

Progesteronwert (international) [ng/ml]	nächster Test
< 1	(3 -) 4 Tage später
1 - 2	(2 -) 3 Tage später
2 - 3	(1 -) 2 Tage später
> 3	(bei Bedarf entsprechend Absprache)

Progesteronwerte rund um die Ovulation bei der Hündin (Internationale Literaturwerte und MiniVidas®-Werte)

	MiniVidas® [ng/ml]	internat. Literatur [ng/ml]
Leichte CI-Aktivität	1,51 bis 3,00	1,10 bis 2,00
LH-Peak (LHo)	3,10 bis 4,50	2,10 bis 3,00
LHo+1	4,51 bis 6,00	3,10 bis 3,99
Ovulation (OV.)	9,00	6,00
Am Tag der Ovulation	6,10 bis 15,00	4,00 bis 10,00
Ov + 1	15,10 bis 22,00	10,10 bis 15,00
(Ov + 2)	22,10 bis 32,00	15,10 bis 20,00
(Ov + 3)	32,10 bis 48,00	20,10 bis 30,00
Frühe / Mittlere Lutealphase	>22	> 15